

Enterococo resistente a la Vancomicina (ERV)

¿Qué son los enterococo resistente a la Vancomicina?

La Vancomicina es un antibiótico que se usa para tratar infecciones. El enterococo es un microbio que vive en los intestinos y en el tracto genital de la mujer.

Cuando la Vancomicina no funciona para tratar los microbios, estos se vuelven resistentes. El término ERV o enterococo resistente a la Vancomicina significa que la Vancomicina no funciona para tratar el enterococo.

El enterococo resistente a la Vancomicina se pueden propagar. Esto sucede cuando no se lavan como deberían las manos o el equipo que han estado en contacto con enterococo resistente a la Vancomicina .

¿Quién está en riesgo de contraer una infección de enterococo resistente a la Vancomicina?

Algunas personas pueden tener más probabilidades de contraer este tipo de infección.

- Personas que han tomado antibióticos por un periodo largo de tiempo.
- Personas que están en el hospital y que han tomado antibióticos por un periodo largo de tiempo
- Personas con sistemas inmunológicos débiles. Esto incluye personas con cáncer y aquellos que se han sometido a un trasplante o cirugía reciente.
- Personas que han tenido una vía intravenosa o un catéter urinario durante un periodo largo.

¿Cómo se tratan el enterococo resistente a la Vancomicina?

Se puede examinar al microbio para encontrar un antibiótico que funcione.

¿Cómo se puede evitar la propagación de los enterococo resistente a la Vancomicina?

En el hospital, asegúrese de preguntarles a los proveedores de atención de salud si hay alguna precaución especial que deba seguirse. Todas las personas deben seguir estas pautas. Asegúrese de recordarles a otros si se les olvida.

Todas las personas deben:

- Lavarse las manos frecuentemente. Esto es muy importante después de ir al baño, antes de preparar comida o comer y después de estar en contacto con alguien que tenga enterococos resistentes a la Vancomicina.

- Utilice guantes si tiene contacto con los fluidos corporales de alguien que tenga enterococo resistente a la Vancomicina. Lávese bien las manos después de quitarse los guantes correctamente.
- Se debe limpiar a menudo cualquier área que pudiera haberse contaminado por la persona con enterococo resistente a la Vancomicina.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.