

### **Tratamiento con láser de colorante pulsado**

#### **¿Qué es el láser de colorante pulsado?**

El láser de colorante pulsado se usa para tratar vasos sanguíneos anormales bajo la piel. El láser crea una luz que pasa a través de la capa superior de la piel. Esta calienta y destruye los vasos sanguíneos anormales.

#### **¿Cómo se lleva a cabo el tratamiento con láser?**

Todas las personas que estén en la sala de tratamiento deben usar anteojos especiales. Estos anteojos protegen los ojos de la luz brillante. Es posible que a la persona que recibe el tratamiento se le cubran los ojos con una tela especial.

El doctor sostiene un bastón que envía el láser a la piel. Esta luz es aproximadamente del tamaño y forma de la punta de un borrador de lápiz. A medida que la luz toca la piel, el paciente podría sentir como un golpecito con una liga de goma.



Durante un periodo corto después del tratamiento, es posible que se sienta comezón o como si la piel estuviera quemada por el sol. Es normal que el área tratada tenga un color gris o morado como un moretón. El color se desvanecerá durante los próximos 7 a 14 días. Se presentará una ligera hinchazón el primer y segundo día después del tratamiento y tomará de 6 a 8 semanas para poder observar el efecto completo. El número y la duración de los tratamientos dependerán del tipo, tamaño y lugar del área tratada.

#### **¿Cómo prepararse para un tratamiento con láser?**

**No** puede broncearse durante al menos 2 meses antes y 2 meses después de cada tratamiento. El láser no funciona tan bien en la piel bronceada o que tiene una pigmentación oscura.

#### **¿Qué tipo de cuidados se necesitan después de un tratamiento?**

- Ponga una compresa de hielo durante 20 minutos inmediatamente después del tratamiento. Coloque hielo en el área de vez en cuando durante el primer día si tiene hinchazón o dolor.
- Ponga pomada Vaseline® en el área tratada 2 a 3 veces al día. Haga esto durante 7 a 10 días para ayudar a mantener la piel sana.
- Si tiene alguna ampolla o costra use Polysporin® u otra pomada de doble antibiótico en lugar de Vaseline®. Comuníquese con la oficina de dermatología.
- Lave con cuidado el área tratada cuando se bañe (duche) en la regadera o en la tina de baño. Puede usar agua y un jabón neutro. Seque el área con palmadas suaves y ponga más pomada.
- Puede usar maquillaje en el área 48 horas después del tratamiento. El maquillaje debe ponerse y quitarse muy suavemente para evitar daños a la piel tratada.

- No se frote, rasque o ponga ningún tipo de presión en el área tratada hasta que los moretones y las costras hayan desaparecido.
- Mantenga descubierta el área tratada a menos que el médico o la enfermera le indique lo contrario.
- No retire costras de la piel en el área tratada.
- Vista a su hijo con ropa holgada sobre el área tratada. La fricción o el roce de la ropa muy ajustada podría causar cicatrices.
- Administre Tylenol® para el dolor ligero.
- No debe jugar de manera brusca o hacer actividades físicas durante al menos una semana después del tratamiento.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

- Moretones, hinchazón, dolor y cambio temporal de la coloración de la piel.
- Efectos secundarios raros:
  - Formación de ampollas, las cuales algunas veces ocasionan cambios en la textura de la piel o cicatrices.
  - Cambio permanente de la coloración que puede ser más clara o más oscura que la piel alrededor del área tratada.

### ¿Cuáles son los cuidados de seguimiento necesarios?

- Proteja el área tratada con un bloqueador solar que contenga un factor de protección solar de #15 o mayor. La piel bronceada bloqueará la luz del láser evitando que llegue a los vasos sanguíneos. El sol puede aumentar la probabilidad de presentar cambios de coloración en la piel o cicatrices.
- El médico revisará la piel tratada y hablará con usted sobre más tratamientos si estos fueran necesarios.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- Tiene señales o síntomas de infección como:
  - Fiebre no asociada con otra enfermedad.
  - Mucha hinchazón.
  - Ampollas.
  - Costras en la piel.
  - Drenaje o supuración.
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**