

Manejo de la bomba para control del dolor y bloqueo del nervio en casa

Su hijo se va a casa con una “bomba para el control del dolor”. La bomba administra un medicamento adormecedor llamado **Ropivacaína**. Este es el anestésico local que bloquea el nervio que percibe el dolor en el área quirúrgica.

¿Cómo administra el medicamento la bomba para el control del dolor?

La bomba para el control del dolor administra el medicamento todo el tiempo en pequeñas cantidades.

Mientras la bomba esté en uso:

- Asegúrese de que no haya goteo del sistema.
- Asegúrese de que los catéteres no estén doblados ni torcidos.
- Si la bomba se cayera o se rompiera, detenga el flujo del medicamento presionando el catéter con la pinza y llame al médico.
- No moje la bomba, el vendaje ni el sitio de inserción del catéter.

¿A quién debo llamar si tengo alguna pregunta o preocupación?

- La enfermera o el médico del Servicio para el dolor agudo (Acute Pain Service) le llamará a diario mientras el bloqueo del nervio esté puesto. Si tiene alguna pregunta o preocupación, nos puede llamar en cualquier momento:
 - De lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. llame al 414-266-2775, presione el número 4 y pida hablar con la enfermera especializada en práctica avanzada del servicio para el dolor agudo. Ella le devolverá la llamada.
 - Después de las 4p.m., los fines de semana y los días festivos, llame al 414-266-2000 y pida que le manden un mensaje por biper al médico de guardia encargado del Dolor crónico o en pacientes ambulatorios (Chronic/Outpatient Pain). El médico le devolverá la llamada.
- El Dr. _____ es el anestesiólogo que le ayudará a utilizar la bomba del bloqueo del nervio una vez que llegue a casa. Llame al _____ o envíe un mensaje por biper al _____ en cualquier momento mientras su hijo tenga la bomba colocada si tuviera cualquier pregunta o preocupación.

¿De qué síntomas debo estar pendiente?

Podría sentir un poco de debilidad, adormecimiento u hormigueo (cosquilleo) en el área afectada por el bloqueo del nervio. Llame al Servicio del dolor si los síntomas molestan a su hijo o interfieren con la actividad.

- Tome medidas de seguridad adicionales para evitar las caídas en casa.
- Su hijo puede tener debilidad o adormecimiento en el área de la cirugía. Ayude a su hijo a levantarse de la cama o del sillón, a caminar o a vestirse. Siga las indicaciones del cirujano en cuanto a la movilidad y actividades.

- No ponga nada de presión en un área adormecida o débil. Mantenga a su hijo alejado de las superficies afiladas o del calor o el frío extremos. Su hijo podría lastimarse ya que es posible que no los sienta. Podría escurrir un poco de líquido del sitio. Si su hijo está cómodo la mayor parte del tiempo, esto no es un problema, pero llámenos si el líquido es bastante.

Llámenos inmediatamente si su hijo tiene alguno de estos síntomas

- Sabor metálico en la boca.
- Adormecimiento en los labios o la boca.
- Sonidos o zumbido en los oídos.
- Está agitado o inquieto, tiene temblores o tics.
- Mareos, somnolencia, visión borrosa.
- Salpullido o ronchas en la piel.
- Aumento del dolor que no mejora con la dosis al oprimir el botón.
- Enrojecimiento, hinchazón, dolor o secreción turbia en el sitio del catéter.
- Convulsiones (**llame al 911 inmediatamente**).

¿Cómo retiro el catéter para el bloqueo del nervio?

La enfermera o el médico del Servicio para el dolor le llamarán el día que se tenga que retirar el catéter. Ellos permanecerán en la línea mientras usted saca el catéter. Siga estas instrucciones:

1. Lávese bien las manos con agua y jabón.
2. Suavemente retire el vendaje y la cinta adhesiva que se hayan utilizado para mantener el catéter en su lugar. Comience en una esquina y jale hacia el catéter pero ¡no corte el catéter!
3. Firmemente sostenga el catéter al nivel de la piel, jálelo suavemente hasta que salga del cuerpo de su hijo. Infórmenos si tiene dificultad para sacarlo.
4. Busque una marca negra o azul o metal en la punta del catéter. Infórmenos si no tiene marcas o una punta de metal.
5. Use un curita para cubrir el sitio. No necesita aplicar pomada ni antiséptico en el sitio.
6. Deseche la bomba y el catéter en la basura de su casa.
7. Lávese bien las manos con agua y jabón.

Es posible que le llamemos nuevamente al día siguiente de haber retirado el catéter. Llame al médico del dolor en cualquier momento si nota enrojecimiento, calor, dolor, aumento de la supuración o hinchazón en el lugar donde estaba colocado el catéter.

Precauciones

- No vuelva a usar la bomba desechable, es para usarse una sola vez.
- Si el cirujano dice que puede bañarse en la regadera (ducha), mantenga la bomba desechable fuera de la regadera o en una bolsa a prueba de agua.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a la enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.