

Tratamientos de nebulizador con mascarilla traqueal

Propósito

- Administrar medicamentos que tratan la sibilancia al respirar y que movilizan las secreciones.
- Administrar corticoesteroides y antibióticos inhalables.

Materiales necesarios

- Máquina nebulizadora
- Medicamentos
- Equipo del nebulizador
 - Recipiente del nebulizador
 - Pieza en T
 - Tubo transparente



Preparación del tratamiento

1. Lávese las manos.
2. Arme el recipiente del nebulizador con un giro fuerte.
3. Se le pueden agregar medicamentos desde arriba.
4. Sujete con cinta adhesiva un extremo de la pieza en T.
5. Ponga la pieza en T encima del recipiente del nebulizador.
6. Use el tubo y la mascarilla traqueal proporcionados durante la instalación del collar traqueal.
7. Conecte el nebulizador a la máquina usando el tubo transparente.
8. Encienda la máquina.

Nota: Si su hijo usa oxígeno, use su oxígeno en vez de la máquina nebulizadora. **Aumente el flujo a 6 u 8 LPM.**

Limpieza del equipo

Después de cada tratamiento

1. Vuelva a armar todo el equipo.
2. Si usa oxígeno, vuelva al ajuste normal.
3. Enjuague el recipiente y la pieza en T con agua tibia.
4. Deje secar al aire sobre un paño limpio.

Limpieza del equipo (continuación)

Todas las noches

1. Lave el recipiente y la pieza en T con agua tibia con jabón.
2. Enjuague bien.
3. Deje secar al aire sobre un paño limpio.

Una vez a la semana

Reemplace el equipo del nebulizador.

Instrucciones especiales

Siga las indicaciones del proveedor de servicios salud domiciliaria de su hijo si lo usa por más de una semana.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.