

## Foliculitis del cuero cabelludo

### ¿Qué es la foliculitis del cuero cabelludo?

Las aberturas de la piel que sujetan la raíz del cabello se llaman folículos pilosos. La foliculitis sucede cuando la abertura de los folículos pilosos se daña o se tapa. Puede provocar dolor y sensibilidad del cuero cabelludo. La causa de la infección puede ser:

- Una bacteria llamada *Estafilococo aureus*, la que se encuentra normalmente en la piel.
- Una lesión al folículo piloso. Estas lesiones pueden suceder cuando se tira demasiado el cabello de su hijo o mientras se peina. La aplicación de productos químicos para el cabello en el cuero cabelludo también puede producir lesiones.



Cuando se lesiona el cuero cabelludo, las bacterias se introducen en los folículos pilosos y esto puede provocar una infección. La infección se propaga rápidamente a los folículos pilosos cercanos. La foliculitis no es contagiosa; su hijo no se la puede pasar a otras personas. Sin embargo, se puede propagar en el cuero cabelludo o en el cuerpo de su hijo.

### ¿Cómo se diagnostica?

El tipo y la ubicación de las llagas ayudarán al médico o a la enfermera a saber que su hijo tiene foliculitis en el cuero cabelludo. Las llagas con frecuencia comienzan como pequeñas protuberancias rojas que rápidamente se convierten en llagas más grandes. Estas llagas con frecuencia están cubiertas con costras color café amarillento o pueden secretar pus. Las llagas normalmente se propagan y aumentan. El niño se puede quejar de dolor, ardor o comezón en el cuero cabelludo.

### ¿Cómo se trata?

- La foliculitis en el cuero cabelludo normalmente se trata con un antibiótico por vía oral. También se puede tratar con un antibiótico que se aplica en el cuero cabelludo.
- Desarme las trenzas u otros peinados que tiren el cabello. Lave suavemente la cabeza de su hijo con un shampoo suave. El cabello que se infecta con frecuencia debe ser lavado más a menudo.
- Evite usar productos para el cabello en el cabello de su hijo mientras se recupera de la infección. No comparta productos para el cuidado del cabello con nadie más.
- Después de recuperarse de la infección, continúe con una buena higiene del cuero cabelludo. Evite tirar demasiado el cabello de su hijo cuando lo peine. Las trenzas en el cabello están demasiado tirantes si no puede introducir con facilidad su dedo meñique bajo las trenzas.

Lave o deseche cualquier artículo que no se pueda limpiar que tenga contacto con cabello infectado. Esto incluye lavar ropa de cama o botar el gel para el cabello que se pueda haber contaminado.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo:

- Tiene llagas que se siguen propagando después de 48 horas de tratamiento.
- Tiene una temperatura de 101° F (38.3° C) o más.
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.**