

Injerto óseo alveolar: Área del cráneo de un donante

(Injerto óseo en las encías)

¿Qué es un injerto óseo alveolar?

Un injerto óseo alveolar es una cirugía para un niño que nació con labio y paladar hendidos. Se realiza la operación para colocar hueso a las encías en el área de la hendidura. Esto ayudará a que los dientes permanentes salgan de las encías (dentición). También ayudará a cerrar el orificio entre la boca y la nariz de su hijo.

¿Cómo se lleva a cabo?

Se extrae una pequeña cantidad de fragmentos de hueso de la cabeza de su hijo. Los fragmentos se colocan en el área de la hendidura cerca de los dientes. Esto ayudará a que los dientes salgan cerca de la fisura.

La cirugía toma aproximadamente entre 2 y 3 horas. Su hijo tendrá una incisión en la cabeza que se cerrará con grapas. Tendrá también puntadas en las encías en el lugar donde se colocó el hueso. Las puntadas desaparecerán por sí solas en unas cuantas semanas.

¿Qué sucede después de la cirugía?

Después de la cirugía, su hijo:

- Estará hospitalizado 2 días. Probablemente tendrá dolor durante al menos 24 horas. Se le puede dar Tylenol[®] para el dolor.
 - Tendrá en la nariz un material parecido a la gasa llamado taponamiento nasal. Tendrá un tubo de drenaje en el área de la cabeza donde se extrajeron los fragmentos. El tubo ayudará a drenar el líquido del área y limitar la hinchazón. Tanto el taponamiento nasal como el drenaje se extraerán la mañana siguiente a la cirugía.
 - Tendrá una incisión en la cabeza con grapas pero sin vendaje. La incisión necesitará atención y limpieza después de la cirugía. Haga lo siguiente 3 veces al día después de la cirugía.
 - Haga una nueva mezcla de ½ porción de peróxido de hidrógeno y ½ porción de agua en una taza limpia.
 - Use la mezcla para limpiar **suavemente** la incisión con un cotonete de algodón.
 - Coloque una capa muy delgada de doble ungüento antibiótico en la incisión.
- Las grapas se retirarán en el consultorio de su cirujano en 10 a 14 días después de la cirugía.
- Se debe **cepillar solamente los dientes inferiores durante los primeros 5 días**. Después de esos 5 días, su hijo se puede cepillar cuidadosamente todos los dientes con un cepillo suave.

- Tendrá que usar durante 6 semanas un enjuague bucal después de todas las comidas, refrigerios y antes de acostarse. Use una mezcla con ½ porción de peróxido de hidrógeno y ½ porción de enjuague bucal de venta sin receta durante las primeras semanas. Después de unas semanas, su hijo deberá usar solamente el enjuague bucal.
- Tendrá que tomar antibióticos orales durante 1 semana.

Dieta:

- Al principio, le colocarán a su hijo una vía intravenosa en el hospital. Esto ayudará a que su hijo no se deshidrate. También se usa para administrar medicamentos.
- Su hijo tendrá que llevar una dieta blanda restringida durante 6 semanas.
- No permita que su hijo use popotes (pajillas) durante al menos 6 semanas después de la cirugía.

Actividad:

- Su hijo podrá darse un baño (ducha) corto 2 ó 3 días después de la cirugía.
- La actividad de su hijo debe limitarse durante 6 semanas. Esto incluye gimnasia (educación física), parque de juegos, actividades deportivas o juegos bruscos.
- Su hijo podrá retomar la terapia del habla, siempre y cuando los ejercicios no requieran que su hijo infle el labio superior o las mejillas.

Seguimiento:

- Su hijo necesitará una cita en la clínica 5 a 10 días después de la cirugía.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo:

- tiene dolor agudo que no desaparece;
- sangra mucho por la nariz o la boca;
- tiene vómitos que no se detienen;
- tiene fiebre arriba de 101° F (38.3° C);
- no bebe suficiente líquido;
- tiene mal olor en la boca;
- escupe pequeños fragmentos de hueso;
- tiene fragmentos de hueso que usted puede ver en el área en la que se realizó la cirugía;
- tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.