

## **Nutrición en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)**

(Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa, Colitis Indeterminada)

### **¿Mis hábitos alimenticios ocasionaron la enfermedad inflamatoria intestinal?**

No, no existe ninguna evidencia de que lo que come sea la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal.

### **¿Debo seguir una dieta especial?**

No existe ninguna dieta "especial" para la enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy importante comer una gran variedad de alimentos para tener una dieta balanceada. Esto le ayudará a obtener las calorías, proteínas y nutrientes necesarios. Manténgase lejos de los alimentos que le ocasionen alguna molestia.

Su proveedor de servicios de salud puede recomendarle alguna de estas dietas. Frecuentemente la dieta se realiza por corto tiempo.

**Sin sal:** se puede realizar esta dieta cuando está tomando esteroides como la prednisona.

**Baja en fibra, bajo en residuo:** se puede realizar esta dieta si sufre de estrechamiento del intestino.

**Baja en lactosa:** se puede realizar esta dieta si tiene intolerancia a la lactosa (azúcar presente en los productos lácteos).



### **Calcio y vitamina D**

Deberá asegurarse de ingerir suficiente calcio y vitamina D que le ayuden a mantener huesos y dientes fuertes. La vitamina D es necesaria para absorber el calcio. Es posible que necesite suplementos. Si necesita más calcio, es mejor ingerirlo en 2 ó 3 dosis al día.

Esta tabla muestra la cantidad requerida de acuerdo a la edad.

<b>Edad</b>	<b>Calcio</b>	<b>Vitamina D</b>
1 a 3 años	700 mg	600 UI
4 a 8 años	1000 mg	600 UI
9 a 18 años	1300 mg	600 UI
19 a 30 años	1000 mg	600 UI

### **Consejos a la hora de las comidas**

- Consuma de tres a cuatro porciones de lácteos al día.

- Añada una porción extra de leche o queso a la pizza, sopas, macarrones con queso y a los productos de repostería y panadería. Esto incrementará el calcio.
- Consuma jugos y alimentos reforzados con calcio.
- Las fuentes de alimentos ricos en calcio incluyen:

Fuente:	Cantidad de calcio
Leche, 8 oz	280-300 mg
Yogurt, 8 oz	350-400 mg
Queso, 1 oz	175-275 mg
Helado, ½ taza	88 mg
Leche de soya fortificada	200-300 mg
Verduras (betabel, col, mostaza, espinaca)	½ taza 100-180 mg

## Suplementos

La mayoría de los suplementos contienen 500-600 mg de calcio. Vienen en pastillas y tabletas masticables. Se mencionan algunos ejemplos abajo. Lea la etiqueta de Información Nutricional para saber la cantidad de calcio que contiene el suplemento. Siempre asegúrese de revisar el tamaño de la porción cuando lea la etiqueta.

Nombre	Cantidad de calcio	Cantidad de vitamina D
Viactiv® (masticable)	500 mg	500 UI
Tums® Potencia regular	200 mg	Ninguno
Carbonato de calcio (genérico)	500 - 600 mg	Varía por marca
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tome vitamina D de acuerdo a las indicaciones de su proveedor de servicios de salud.</li> <li>• Si su multivitamina tiene vitamina D, añada la cantidad al total de UI de vitamina D.</li> <li>• Revise la cantidad de calcio y vitamina D en marcas genéricas.</li> </ul>		

## Hierro

El hierro ayuda a los glóbulos rojos a transportar el oxígeno en el organismo. También es necesario para el crecimiento. La anemia por deficiencia de hierro es bastante común en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que ocasiona que se fatigue fácilmente y se enferme con frecuencia.

**Alimentos ricos en hierro:** Algunos alimentos son mejores fuentes de hierro que otros.

### Fuentes con una rica cantidad de hierro

- Hígado de res
- Hígado de pollo
- Hamburguesa
- Cerdo
- Carne de venado
- Pollo
- Pavo
- Atún, salmón, pescado

### Fuentes con una muy buena cantidad de hierro

- Barras de cereal
- Sémola de trigo
- Avena
- Germen de trigo
- Cereales (con 45% o más del valor total diario de hierro)

### Fuentes con una cantidad considerable de hierro

- Pasas
- Pan enriquecido
- Nueces y semillas
- Espinaca
- Brócoli
- Calabaza de invierno
- Pasta o arroz enriquecido
- Tomates

## Consejos para una buena alimentación

- Elija una fuente rica en hierro y otras dos a tres fuentes de hierro diariamente.
- La vitamina C ayuda a que su cuerpo absorba el hierro. Beba un vaso (4 oz) de jugo de naranja, arándano o jugo enriquecido con vitamina C, o consuma una fruta cítrica con excelente fuente de hierro para su mejor absorción.
- Agregue alimentos que sean ricos en hierro a otros alimentos para fortalecer su consumo. Intente agregar germen de trigo a las hamburguesas o al pastel de carne. Agregue avena a las galletas.



## Requerimientos de hierro diario en niños y adolescentes

Edad	Requerimiento diario
1-3 años	7 mg
4-8 años	10 mg
9-13 años	8 mg
14-18 años	11 mg (hombres), 15 mg (mujeres)
19 a 30 años	8 mg (hombres), 18 mg (mujeres)
Basado en la Ingesta Dietética de Referencia 2001	

## ¿Qué otras elecciones de alimentos existen?

Se están realizando estudios en el área de la dieta y suplementos para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay mucho que aprender. Debe hablar con su médico o nutricionista sobre el consumo de dietas o suplementos especiales, los cuales no deben usarse en lugar del tratamiento médico.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**