

## Tabla de alta para irse a casa de \_\_\_\_\_

- Puede tomar *acetaminophen* (Tylenol® simple) o Tylenol con narcótico (Roxicet™ o Lortab®) cada 4–6 horas. Use una o la otra (pero no ambas) cada 4–6 horas según lo necesite para el dolor.
- Algunos doctores no permiten el uso de *ibuprofen* después de la cirugía. Si su doctor recomienda tomar *ibuprofen*:
  - Puede darle *ibuprofen* tan seguido como cada 8 horas para ayudarle con el dolor y la hinchazón. Podría requerir dárselo siguiendo un horario estricto durante los próximos 7–10 días, dependiendo de qué tan intenso sea el dolor de su hijo.
  - El *ibuprofen* puede dárselo al mismo tiempo que las otras medicinas si la hora de dárselas coinciden o se superponen.

### Medicinas

#### Día 1

Nombre de la medicina	Dosis	Puede darla cada	Hora en que se le dió					

#### Día 2

Nombre de la medicina	Dosis	Puede darla cada	Hora en que se le dió					

#### Día 3

Nombre de la medicina	Dosis	Puede darla cada	Hora en que se le dió					

#### Día 4

Nombre de la medicina	Dosis	Puede darla cada	Hora en que se le dió					

