

## **Retiro de la sonda de gastrostomía (Sonda-G) o de Yeyunostomía (Sonda-Y)**

### **¿Por qué se tiene que quitar la sonda?**

- El médico de su hijo ha decidido que ya no se necesita la sonda.
- Se colocará un vendaje de presión sobre el sitio de la sonda después de haberla quitado.

### **¿Qué es un vendaje de presión?**

- Es un vendaje apretado y limpio que cubre el sitio de la sonda.
- Absorbe la supuración del sitio y ayuda a que el tracto del estómago o los intestinos se cierre.
- Casi todos los tractos cierran en unos cuantos días.
- Otros tractos pueden demorar unas semanas en cerrar.
- Si el tracto no cierra por sí solo, es posible que su hijo necesite cirugía.
- El médico de su hijo le hablará con usted acerca de la cirugía si el tracto no cierra por sí solo.



### **¿Cuándo debe cambiarse el vendaje de presión?**

- El vendaje de presión tiene que cambiarse:
  - Por lo menos una vez al día.
  - Siempre que esté empapado de supuración.
- La mejor hora para cambiar el vendaje es antes de comer cuando el estómago está vacío.

### **¿Qué materiales necesito para cambiar el vendaje de presión?**

- Gasa de 3 x 3 (2 piezas)
- Cinta adhesiva de seda o de espuma

### **¿Cómo cambio el vendaje de presión?**

- Lávese las manos con agua tibia y jabón.
- Quite el vendaje viejo.
- Limpie el sitio con agua tibia y jabón.
  - Está bien si su hijo se da un baño de esponja o se baña y se limpia el sitio al mismo tiempo.
  - Puede dejar que el sitio se seque al aire o puede dar palmaditas suavemente con una toalla para secarlo.

- Prepare cuatro (4) pedazos de cinta de seis pulgadas y téngalos listos para usar. Seis pulgadas es aproximadamente lo largo de su mano, de la muñeca a la punta de su dedo más largo.
- Doble un pedazo de gasa por la mitad. Dóblelo otra vez a la mitad.
  - Ponga esta gasa doblada sobre el sitio.
- Doble un segundo pedazo de gasa a la mitad.
  - Ponga esta gasa doblada sobre el primer pedazo de gasa.
- Use las tiras de cinta para mantener la gasa ajustada al sitio.
  - Asegúrese de que todos los bordes del vendaje estén cubiertos.

## **Información especial**

- Para ayudar a controlar la supuración del sitio después de colocar el primer vendaje de presión:
  - Su hijo no debe comer ni tomar líquidos por un mínimo de 3 horas después de que se le quite la sonda. Después, su hijo puede comer pequeñas cantidades de fórmula pero ofrézcaselas más a menudo por unos días.
  - Anime a su hijo a que juegue tranquilo durante un día después de que se le quiten la sonda.
- Para disminuir la irritación de la piel alrededor del sitio:
  - Use crema para la rozadura causada por los pañales, como Desitin®, para proteger la piel.
  - Asegúrese de limpiar la piel con agua tibia y jabón y secarla antes de untarle la crema.

## **Cuidados de seguimiento después de retirar la sonda**

- Programe una cita en la Clínica de Cirugía en 2-3 semanas a partir del momento en que le quitaron la sonda.
  - Línea de citas de la Clínica de Cirugía: 414-607-5280.
  - Programación Central: 800-607-5280.
- Si el sitio no se cierra, podría ser necesaria una cirugía.
  - Si fuera necesario, el médico cirujano de su hijo hablará con usted acerca del procedimiento.
- Si el sitio cierra antes de esta cita, puede cancelarla.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si:

- El sitio drena después de una semana.
- La piel está muy roja, le duele mucho o si la piel comienza a pelarse en el sitio de la sonda.
- Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**