

## **Cirugía de la membrana del tímpano (Miringoplastia)**

La cirugía para reparar una perforación en la membrana del tímpano se llama miringoplastia. Hay dos opciones para reparar la perforación.

- **Parche de papel.** Se coloca un papel especial sobre la perforación.
- **Parche de grasa.** Se usa una pequeña porción de grasa extraída de la parte de atrás del oído.

Su médico hablará con usted sobre el mejor procedimiento para su hijo.



### **¿Qué debo saber antes de la cirugía?**

- El mejor momento para la cirugía es cuando su hijo esté sano. Si su hijo no tiene ningún signo de enfermedad, comuníquese con su médico o con la enfermera de inmediato. Si su hijo tiene fiebre o está enfermo, podrían cancelar la cirugía.
- **No le administre aspirinas o ibuprofeno (Motrin, Advil, Pediaprofen, Naproxen o antiinflamatorios no esteroides) durante las dos semanas previas a la cirugía.** Estos medicamentos funcionan como anticoagulantes, y podrían aumentar el riesgo de hemorragia durante la cirugía y después de esta. Está permitido que le administre Tylenol para combatir la fiebre o el dolor antes de la cirugía. Si a su hijo le indican un medicamento nuevo antes de la cirugía, comuníquese con nuestro consultorio.



### **¿Qué debo saber después de la cirugía?**

**Seguimiento.** El médico examinará a su hijo aproximadamente 2 semanas después de la cirugía.

**Dieta.** Su hijo podrá seguir su dieta habitual después de la cirugía.

#### **Actividades**

- No podrá sonarse la nariz durante 2 semanas. Intente que mantenga la boca abierta al estornudar.
- No podrá nadar, hacer deportes de contacto u otras actividades hasta que usted hable con el médico en la visita de seguimiento.

**Baño.** Es importante que **mantenga el oído reparado seco** hasta que la cita de seguimiento de su hijo.

- Necesitará ayuda y cuidados adicionales durante el baño y el lavado de cabello para que no entre agua en el oído.
- Su hijo podría usar una mota de algodón con vaselina para evitar que entre agua al oído.

**ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo:**

- Tiene dolor intenso o fiebre de 101 °F (38.3 °C).
- Tiene hemorragia o secreciones del oído.
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.**